

Resumen

Área total afectada por sequía




43.616.447 Hectáreas

Variación del área afectada respecto a Abril



20 M Hectáreas Aprox.

A nivel país, la superficie total en sequía se redujo un tercio respecto del mes anterior. La mejora general se dio principalmente en NEA, donde no se observó sequía moderada y la categoría leve se redujo un 75% en comparación con abril. La categoría moderada solo se mantuvo en Patagonia. Por otra parte, en NOA, Patagonia y Cuyo la categoría leve se mantuvo estable. Se destacó en Cuyo la salida de la categoría moderada.



Factores en riesgo

Stock Bovino



71.241 Cabezas

Cultivos



0 Hectáreas*

Población



0 Hogares**

* Aclaración: el cálculo de las has de cultivos afectados se realiza mediante el cruce entre el área en sequía moderada y severa y las categorías regular, mala y muy mala informadas por los delegados del SAGYP para estimaciones agrícolas.

** Este dato no contempla capitales de provincias ni distritales. Se calcula exclusivamente en casos de área afectada por categoría severa.

Indicadores



Precipitaciones

Mes lluvioso en casi todo el este y norte de Argentina con varias zonas afectadas por intensos temporales de lluvias, tormentas y granizo. El norte de Buenos Aires resultó severamente afectado por inundaciones. Por el contrario gran parte del centro y norte de Patagonia, región central y Cuyo, registró déficit de lluvias por lo que las condiciones de sequía tendieron a persistir. Las condiciones del ENOS se mantienen neutrales y el pronóstico prevé que continúe sin mayores cambios en los próximos meses.



Humedad de suelos

Los índices de humedad del suelo mostraron un aumento significativo de los almacenajes en las zonas antes afectadas del NEA, aunque el déficit persistió durante la mayor parte del mes en el norte de Misiones. En las regiones central, cuyana y patagónica se observaron algunas fluctuaciones, sin cambios remarcables en el Centro y con un alivio generalizado de la condición de sequía en las otras dos regiones, que, sin embargo, mantuvieron el déficit hídrico.



Impacto

En Chaco se reportó un cambio drástico en la situación, pasando de una intensa sequía a excesos hídricos en las últimas semanas. Esta variación ha provocado demoras en la cosecha de algodón y soja, aunque ha favorecido el estado de los cultivos de sorgo y maíz. En la región Patagónica, si bien las precipitaciones fueron inferiores a las habituales para el inicio del otoño, se observa la presencia de algunas lagunas y acumulaciones de agua en el campo. Además, se destaca una buena condición general del ganado y del forraje.



Indices de vegetación

Las anomalías del NDVI registradas en el último período fueron positivas en la mayor parte del territorio nacional. En áreas puntuales de Santiago del Estero, Chaco, y Patagonia los valores del índice fueron menores al promedio histórico.



Hidrología

En la Cuenca del Plata, el río Paraná mostró una evolución hacia aguas medias bajas en sus principales puertos. El río Paraguay continuó el repunte hacia aguas medias durante todo el mes. El Uruguay alcanzó aguas medias altas a causa de las precipitaciones locales. Las presas nacionales monitoreadas por ORSEP presentaron niveles normales en todas las regiones evaluadas

El monitoreo de sequías meteorológicas y agropecuarias de Argentina proporciona una visión integrada de las condiciones de sequía en el territorio nacional. El análisis es realizado por una mesa interinstitucional de especialistas y se basa en varias fuentes de datos, incluidas observaciones de expertos en campo, de acuerdo con el Protocolo interinstitucional de gestión de información ante la amenaza de sequías en el territorio argentino: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_ed/sequia/2022_protocolo_sequias.pdf El mismo pretende identificar áreas con probable afectación por sequía, y su impacto concreto dependerá del sistema productivo, el manejo predial, la infraestructura disponible, entre otros condicionantes locales.